


๑๔๗๓
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ ๐๐๑๕๗๒
วันที่ ๒๓ พค ๒๕๖๒

ที่ สธ ๐๔๓๓.๓/ น ๒๐๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจต่อการป้องกันควบคุมโรค การสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญในการป้องกันควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ๒ ภาษารวมทั้งสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่น มีความรู้ สร้างความตระหนักในมาตรการป้องกันโรค และลดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน เพื่อให้ข้อมูลโรคและภัยสุขภาพที่รวดเร็ว และทันเวลา ทันต่อสถานการณ์แก่ประชาชน จึงขอจัดส่งสื่อความรู้เรื่องโรคความรู้เรื่อง โรคหัด ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ภาษาไทย ชนิดโปสเตอร์ และชนิดแผ่นพับ และภาษามลายู ชนิดโปสเตอร์ และชนิดแผ่นพับ (ภาษามลายูในบางพื้นที่) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว และเมื่อได้รับสื่อดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งใบตอบรับมาที่สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๓๘๖ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๘๕๕

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๓๘๖



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

โรคหัด (Measles)

โรคหัด (Measles)



เกิดจากเชื้อไวรัสหัด (Measles) เชื้อนี้ตรวจพบในโพรงจมูก และลำคอของผู้ป่วย โรคหัดพบได้ในทุกกลุ่มอายุ แต่เกิดบ่อยในเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีน ในเด็กเล็กอายุ 9 เดือน ถึง 6 ปี

การติดต่อ

โดยการหายใจเอาละอองอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสหัดจากการไอ จาม หรือพูดกันในระยะใกล้ชิดกับผู้ป่วยเข้าไป



อาการและอาการแสดง

ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายไข้หวัด คือ มีไข้ น้ำมูกไหล ไอ บางรายตาแดง ตาแพ้แสง ตาเยื่อขาว มีจุดขาว ๆ เล็ก ๆ ที่กระพุ้งแก้ม หลังจากมีไข้ ประมาณ 3 - 4 วัน จะเริ่มมีผื่นนูนแดงขึ้น มักเริ่มจากใบหน้าบริเวณชิดขอบผม

และร่างกาย เมื่อผื่นขึ้นประมาณ 1 - 2 วัน ไข้จะเริ่มลดลง ส่วนใหญ่ผื่นจะจางหายไป ประมาณ 2 สัปดาห์ บางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง โดยเฉพาะในเด็กอายุ ต่ำกว่า 5 ปี ผู้ที่มีภาวะขาดสารอาหาร ภูมิคุ้มกันต่ำ





โรคแทรกซ้อน

เช่น คออักเสบ
อุจจาระร่วง ปอดบวม
และอาจทำให้เสียชีวิตได้
ในเด็กที่ขาดสารอาหาร
บางรายอาจทำให้ตาบอดได้

การรักษา

โรคหัดไม่มียารักษาเฉพาะ แพทย์จะให้การรักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ หรือยาแก้ไอ ผู้ป่วย ควรดื่มน้ำบ่อย ๆ หากมีอาการ ไอมาก หอบเหนื่อย ไข้สูง ซึมลง หรือรับประทานอาหารได้น้อย ควรรีบพบแพทย์



วิธีป้องกัน



ป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม
ป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม
ป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม
ป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม
ป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม
ป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม
ป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม
ป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม
ป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม
ป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม

ได้รับวัคซีนแล้วอาจมีอาการปวด
บวมแดง ร้อนบริเวณที่ฉีด และหลังจากนั้น 7 - 10 วัน อาจ
มีไข้ เป็นผื่น หรือก่อนที่คอโตขึ้นไม่ต้องตกใจเพราะอาการ
เหล่านี้ไม่รุนแรง และหายไปได้เองในเวลา 2 - 3 วัน

คำแนะนำสำหรับประชาชน

1. ผู้ปกครองควรนำบุตรหลานของท่าน
ไปรับวัคซีนหัดตามกำหนด เริ่มแรก
เด็กอายุ 9 เดือน และเข็มที่สอง
อายุ 2 ปีครึ่ง สามารถรับวัคซีน
ได้ทุกสถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน



2

โรคหัด ควรไปพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและควรร
หยุดเรียนหรือหยุดงานจนดี 4 วัน หลังจาก
มีผื่นขึ้น หากจำเป็นต้องออกไปในที่ชุมชนในช่วง
ที่มีอาการป่วย ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง



“ โรคหัด ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
เด็กที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด
เมื่อติดเชื้ออาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น อูจจาระร่วง
สมองอักเสบ ปอดบวม และตาบอด
รวมถึงเสียชีวิตได้ ”

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3855

สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

www.riskcomthai.org